

ИНСТРУКЦИЯ

для медицинского применения препарата

ИХТИОЛ

Состав лекарственного средства :

действующее вещество: 1 суппозиторий содержит ихтиола 200 мг

вспомогательные вещества: жир твердый.

Лекарственная форма. Суппозитории ректальные.

Суппозитории темно-бурого цвета с запахом ихтиола. Допускается появление едва заметного белого налета на поверхности суппозитория.

Название и местонахождение производителя.

ПАО « Монфарм ». Украина, 19100, Черкасская обл., Г.. Монастырище, ул. Заводская, 8.

Фармакологическая группа. Антигеморроидальные средства для местного применения.

Код АТС С 05 А Х .

Ихтиол содержит примерно 10,5% серы в виде органических соединений, чем обусловлены его антисептические, противовоспалительные и обезболивающие свойства. Противовоспалительное действие связано с угнетением высвобождения медиаторов воспаления. При ректальном применении препарат вызывает раздражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки, из-за чего рефлекторно усиливается кровообращение в органах малого таза, что способствует устранению воспаления в предстательной железе у мужчин; в яичниках, маточных трубах, матке - у женщин.

При ректальном введении хорошо всасывается в прямой кишке. Выводится с калом.

Показан ния для применения. В комплексном лечении воспалительных заболеваний малого таза (метрит, параметрит, сальп и нг и т, аднексит, оофорит), хронического неспецифического простатита и геморроя.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат можно применять в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Данные отсутствуют.

Дети. Не изастосовуваты детям.

Способ применения и дозы. Назначать взрослым. Вводить ректально по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки после очистительной клизмы или после обычного акта дефекации. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально. Обычно курс лечения составляет 7-14 дней. При рецидиве заболевания курс лечения повторить.

Передозировки. Не описано.

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции, включая зуд, кожные высыпания, отек, покраснение в месте введения препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Взаимодействие препарата в виде суппозиториев с другими лекарственными средствами не описано.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 5 суппозиториев в стрипе. По 2 стрипа в пачке из картона.

Категория отпуска. Без рецепта.